Observation sur une fracture causée par le ramollissement des os, dont la guérison s'est operée parfaitement.
par Mr Buttet.

Une femme qui demeure dans la même maison que moi, a un Enfant rakitique, âgé d'environ quatre ans, dont les os sont si moûs, que sa jambe gauche se cassa dans sa partie inferieure du côté qu'elle etoit courbée, sans cause manifeste. Il me sembla qu'il n'y avoit solution de continuité au tibia, que dans le demi-diametre ~~dont la partie~~ de cet os, du côté de sa convexité, qui étoit sa partie interne. Je lui redonnai sa premiere figure, et je ne l'y maintins qu'avec quatre attelles, et une suffisante quantité de bandes. l'os a recouvré sa premiere solidité en 35 ou 40 jours.

Autre observation sur une fracture de cuisse, dont la reduction quoiqu'imparfaite, n'a été suivie ni de claudication, ni d'aucune autre incommodité.

Un sac de farine tomba sur un Enfant de quatre ans et demi, de façon qu'il fut renversé ~~sur~~ en devant, ayant la Jambe gauche croisée sous son ventre. les articulations du genouil et de la cuisse avoient resisté, mais le femur s'etoit cassé dans sa partie moyenne et un peu superieure. Je reduisis cette fracture autant bien que je le pus; je la maintins reduite suivant la methode de Mr Petit; je situai la partie d'une maniere convenable. Mais quelques precautions que je prisse, l'enfant faisoit tant de mouvemens pour jouër avec ses camarades qui se plaçoient au bord du lit du coté opposé àla maladie, que je trouvois toujours la pointe

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

du pied qui restoit immobile, tournée endehors par rapport à la situation du corps de l'enfant qui se couloit toujours en devant, c'est adire du côté droit: Desorte que le Cal se forma à la suite de tant de mouvemens; cequi fut cause que les deux bouts de los cassé ne se touchoient que par une tres petite portion de leur diametre. — au bout de 40 jours il commença de marcher; mais — la pointe du pied se tournoit en dehors lorsqu'il le levoit pour l'avancer. Cependant en moins de Six semaines depuis qu'il commença à marcher, le pied a reprit son premier état; et aujourdhui l'enfant qui a près de huit ans, ne se ressent de rien.

Autre sur une Luxation du doigt annulaire.

Je me souviens qu'en 1748, en me promenant dans l'hôtel royal des invalides, je vis tomber un vieux soldat qui se servoit de bequilles. Je courus lui aider à se relever. il S'etoit luxé le doigt annulaire dans la jointure des deux premieres phalanges entre elles: — de sorte que l'extremité de ce doigt regardoit l'auriculaire, et que la premiere et seconde phalanges formoient un angle droit. je lui offris de le lui remettre; mais il prit lui même l'extremité de son doigt qu'il replaça aussitôt, et il s'en servit dans le même instant comme s'il n'eut jamais été blessé.

Observation